Advertencia acerca del uso de los "pañuelos portabebés" para evitar asfixia en los lactantes

La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos(*) ha publicado una advertencia acerca del uso correcto de estos "pañuelos portabebés". Se han contabilizado al menos 14 muertes por su utilización incorrecta.

Estas medidas son aplicables a todos los lactantes pero constituyen un grupo de riesgo los lactantes menores de 4 meses, ex-prematuros, recién nacidos con bajo peso al nacimiento o con procesos infecciosos respiratorios.

Correcto
La cara está apoyada sobre el borde de la tela y no está cubierta por el pañuelo. El rostro del lactante está permanentemente visible y sus vías respiratorias no están obstruidas

Incorrecto
La cara está completamente cubierta por el pañuelo y no es visible permanentemente

Incorrecto
El lactante está encorvado y con el mentón apoyado en el pecho: riesgo de asfixia por oclusión de la vía aérea

Incorrecto
El lactante tiene apoyada la cara contra el cuerpo de la madre (o contra la tela): riesgo de asfixia por oclusión de la vía aérea

(*) http://www.cpsc.gov/cpscpub/spanish/11044s.html

Servicio de Neonatología. ICGON. Hospital Clínic Barcelona